

Witt



Hvidblomstret vinterrapsort optaget på sortlisten i Danmark og EU i 2013.

Forædler: Knold + Top aps. Repræsentant: Nordic Seed A/S.

Witt (=Top 16) er en dobbeltlav vinterrapsort med hvide blomster. **Sortstype:** Linjesort. **Plantehøjde:** Middel til lang. **Blomstringsstart:** Middeltidlig. **Modning:** Tidlig til middeltidlig. **Tendens til lejesæd:** Svag. **Olieindhold:** Høj. **Proteinindhold:** Middel. **Glucosinolatindhold:** Lav, 13,7 µmol/g frø [fra sortlisten].

Afstamning: [kompleks krydsningsserie]/Caracas/Labrador.

Såning: Witt skal sås tidligt eller medium [normalt]. Ved sen såning bliver udbyttet ofte for lavt, da sorten udvikler sig lidt langsomt i efteråret.

Høst: Witt er let at høste, næsten som en hvedeafgrøde.

Resultater fra de danske landsforsøg 2012 - 2014:

	Frøudbytte [standardkvalitet]			Olieindhold		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Udbytte, 100 =	51,5 hkg/ha	54,5 hkg/ha	52,1 hkg/ha	%	%	%
Sortsblanding *	100	100	100	49,6	49,5	50,4
Witt [L]	95	100	92	49,1	48,6	50,0
Sesame [L]	98	106	103	50,0	50,1	50,8
Noblesse [L]	96	101		50,6	50,4	

*) Sortsblanding 2012: Excalibur [H] +PR46W14[H] +Sesame [L] + Vision [P]. Sortstype: L = linje, H = hybrid, P = population

*) 2013: Alabaster [H] +PR46W14[H] +Sesame [L] +ES Astrid [L].

Fedtsyresammensætning i olie fra Witt [tal fra de danske officielle forsøg]

Fedtsyre	% [2011]	% [2012]
Oliesyre - C 18:1	56,4	56,3
Linolsyre - C18: 2	24,8	24,2
Linolensyre - C18: 3	10,3	11,1
Erucasyre - C 22:1	0	0

Dyrkningsegenskaber [data fra de officielle forsøg 2011 - 2012]

	Plantehøjde [cm]		Tendens til leje 0-10, 10=flad		Begyndende blomstring, dato		Modningsdato		Frøvægt, mg	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Sortsblanding	145	140	0	1,1	05-05	25-04	15-07	14-07	5,6	4,6
Witt [L]	144	135	0	1,6	02-05	24-04	17-07	12-07	5,9	5,1
Sesame [L]	148	144	0	0,6	05-05	27-04	15-07	15-07	5,4	4,8
Noblesse [L]	145	130	0	0,4	05-05	27-04	19-07	16-07	5,5	4,4